

О влиянии на организм наркотических средств получаемых из конопли

Опасность неконтролируемого обращения наркотических средств и психотропных веществ общеизвестна. Наиболее распространёнными в незаконном обороте являются наркотические средства, получаемые из растения конопля, такие как марихуана, гашиш и гашишное масло. Для изготовления наркотических средств, пригодны практически все сорта конопли. Так как в посевной конопле пониженное содержание наркотически активного компонента, то чаще всего используют дикорастущую коноплю. Самый простой способ изготовления наркотического средства – измельчение частей растения - получение наркотического средства марихуана.

Психические расстройства, вызванные курением марихуаны

Продолжительность психических расстройств от курения конопли, как правило от нескольких часов до 36 часов. Во время этих расстройств у курильщика конопли может возникнуть тревога и паника, ощущение искаженности окружающего мира, нарушение восприятий в виде иллюзий и галлюцинаций, параноидный бред.

Выздоровление от подобных психозов не всегда успешное, так как возможны ремиссии или так называемые «флешбэки» от англ. «flashbacks». В Голландии, где «рай» для тех, кто курит коноплю, для врачей такие вот «флешбеки» уже давно не новость, количество пациентов курильщиков конопли только растёт. В Голландии уже давно ставится вопрос о социальной опасности таких вот курильщиков конопли, в состоянии наркотического опьянения они причиняют вред не только себе, но и окружающим. Те люди, которые постоянно курят коноплю у них как привило продолжительные психические расстройства, длительно не проходящие после того как они бросили курить коноплю.

Курение марихуаны и шизофрения

Шведские ученые в течение 15 лет вели работы о выявлении последствий от курения конопли, и выяснили, что шизофрения в 6 раз чаще возникает у курильщиков конопли. У тех же курильщиков конопли, у которых есть предрасположенность к этому заболеванию, оно возникало практически у каждого. Так же ученые заметили, что курение конопли вызывает апатию, вялость, нарушения мышления, навязчивые страхи, “эмоциональную тупость”, депрессии и ощущение “бессмысленности жизни”. Развивается «амотивационный синдром», но некоторые врачи его принимают за проявление шизофрении.

Нарушение познавательных функций - последствия курения марихуаны

В одном тщательно выполненном исследовании Block и Ghoneim (1993) выяснилось, что у лиц курящих марихуану были заметные ухудшения в воспроизведении запомненного материала (тест Bushke), устной речи и математических способностей, - по сравнению с контрольной группой.

У лиц, которые бросили курить коноплю от 6 месяцев до 3 лет, продолжался дефицит внимания, нарушение кратковременной памяти.

Дыхательная система и вред курения марихуаны

Наибольший вред курение конопли наносит органам дыхания. Содержащиеся опасные вещества в дыме конопли (смолы, растительные микроволокна, более 4000 продуктов горения) способны вызвать не только хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких, но и рак легких.

Курение марихуаны наносит вред репродуктивной системе человека

Интоксикация вызываемая курением конопли неблагоприятно сказывается на количестве сперматозоидов, подвижности и живучести – это все причины бесплодия. Так же курение конопли отрицательно сказывается на гормональном фоне человека, у женщин курящих коноплю происходит нарушение менструального цикла. Курение конопли во время беременности приводит к появлению на свет ребенка с недостаточным весом, беспокойного, возбудимого с ослабленными естественными рефлексам «фетальный каннабисный синдром» - рождается ребенок с нарушенной психикой.

Курение марихуаны приводит к инфантилизму

Конопля содержит в себе психоактивные вещества, которые при курении попадают в кровь человека и разносятся по всему телу, кроме того эти вещества имеют большую тропность к жировой ткани человека и способны там сохраняться в течение нескольких месяцев постепенно поступая обратно в кровь. Эти психоактивные вещества скрашивают реальную действительность и уменьшают беспокойство субъекта относительно вопросов своего бытия. Подобная лёгкость постепенно переходит в легкомыслие. Под действием психоактивных веществ конопли естественная тревожность уменьшается и тем самым уменьшается эмоциональный процесс созревания индивидуума. Таким образом, эмоциональное развитие отстает от биологического, и постепенно формируется психопатизированная личность, которая не только сама испытывает существенные проблемы во взаимоотношениях с другими людьми, но и приносит немало беспокойства окружающим.

Курение марихуаны вызывает социальную апатию

Апатия, возникающая вследствие курения конопли, также затрудняет социальное развитие личности. Она не позволяет прикладывать достаточно усилий для получения образования и эффективного выполнения своей работы, что может повлечь не только замедление, но и разрушение карьеры. С другой стороны, та же апатия мешает следить за своим здоровьем и внешностью, что резко затрудняет межличностные (в том числе семейные) отношения.

Переход на тяжёлые наркотики начинается с курения марихуаны

Да в интернете много мусолится по поводу того, что курение конопли редко приводит к героиновой наркомании. Но ведь нам хорошо известно, что школьник начавший курить почти со 100% гарантией начнет употреблять сперва пиво, а потом и водку, по сравнению с некурящим. Так и тут курение марихуаны – это входные ворота героиновой наркомании или другого тяжелого наркотика. Люди, курящие коноплю постепенно привыкают к постоянному «кайфу» у них постепенно понижается психологический барьер в отношении тяжелых наркотиков. Уже хорошо известно, что толкает курильщиков конопли к

принятию других наркотиков. Когда курильщику нужно срочно получить «кайф», но рядом нет любимой конопли, но есть другие наркотики – это его может спровоцировать «разочек» попробовать и его (это часто происходит на «точках» продажи). Не это ли объясняет рост в городах подростков, которые подсаживаются на героин?